

Esta guía no reemplaza la evaluación de un médico ni constituye una orden de laboratorio formal — es un punto de partida para hacerse los estudios antes de la primera consulta, para que el análisis inicial del CIE sea lo más completo posible.

PARA

Persona interesada en evaluar un protocolo de péptidos con CELLISSE

ESTUDIOS SOLICITADOS

- Glucosa en ayunas
- Insulina en ayunas
- HOMA-IR (calculado)
- HbA1c
- Colesterol total, HDL, LDL, Triglicéridos
- PCR ultrasensible
- IL-6
- ALT (TGP), AST (TGO), GGT
- Creatinina y eGFR
- TSH, T3 libre, T4 libre
- IGF-1 basal
- Cortisol basal (8:00 AM, en ayunas)
- Testosterona total y libre
- LH y FSH
- SHBG
- Estradiol (E2)
- Prolactina
- Vitamina D (25-OH)
- Vitamina B12
- Hemograma completo
- InBody 570 o DEXA (composición corporal)

📌 **Requiere ayuno previo (mínimo 8-12 horas) — glucosa e insulina en ayunas**

NOTA — TIMING DEL CICLO

En mujeres premenopáusicas con ciclo regular: extraer LH, FSH y Estradiol entre el día 2 y 5 del ciclo (fase folicular temprana). En mujeres posmenopáusicas no aplica esta restricción. Progesterona (día 21) y AMH se agregan solo si el objetivo del protocolo involucra evaluación de función ovulatoria o reserva ovárica — no forman parte del panel base.